

## Phase2 メンバーシート

	性別	年齢	障害名	排泄方法	写真
A	男	30代	脊髄傷による両下肢全廃 損傷部位 T11、12	<ul style="list-style-type: none"> <li>・排尿 腹圧を使って排尿し、日中は収尿器を使用し 寝る時は尿取りパッドを使用</li> <li>・排便 腹圧をかけながら排便</li> </ul>	
B	男	40代	頸椎損傷による 四肢体幹機能障害	<ul style="list-style-type: none"> <li>・膀胱路にて排尿</li> <li>・下剤を使って排便を行う</li> </ul>	
C	男	60代	頸髄損傷による 四肢体幹機能障害	<ul style="list-style-type: none"> <li>・排尿:バルーンカテーテル (2週間に1回交換)</li> <li>・排便:トイレで仰臥位にて排便 所要時間1.5時間くらい 「盲腸ポート」部分より浣腸120ccを注入</li> <li>・日常:在宅、外出時ともに紙おむつ使用</li> </ul>	
D	男	30代	頸髄損傷C5-6による 四肢体幹機能障害	<ul style="list-style-type: none"> <li>・排尿:バルーン留置, 一日3回廃棄</li> <li>・排便:ベッド上, 下剤・座薬・浣腸を使用 週2回で一回2時間程度.</li> </ul>	
E	女	40代	脳性麻痺による 四肢体幹機能障害	<ul style="list-style-type: none"> <li>・在宅時は夜間も含めて、ポータブルトイレにて自然排尿管 クッション性が高いので、下着代わりにリハビリパンツ着用</li> <li>・排便はポータブルトイレにて行う 外出時にはテープおむつとリハパンを同時に着用する</li> </ul>	